

Kdy můžete zkusit léčit dítě sami, než kontaktujete lékaře

- 1/ má-li teplotu v délce trvání do 5ti dnů a jeho celkový stav se během této doby nehorší, dobře snáší podávání léků a daří se alespoň trochu teplotu snížit, pije a močí.
- 2/ pokud dítě zvracelo, ale zvracení už ustalo a dítě se spontánně zotavuje, pije a močí
- 3/ pokud má kašel, jehož frekvence se výrazně nezvyšuje a není dušné nebo schvácené
- 4/ pokud má rýmu
- 5/ pokud má vyrážku, která mizí po podání léků proti alergii a není spojena s teplotou
- 6/ pokud má ekzem
- 7/ pokud ho při horečce bolí kouby a svaly a bolest se zmírňuje po podání léků proti bolesti a teplotě
- 8/ pokud ho bolí ucho a přestane po podání ušních kapek a analgetik
- 9) když dítě bolí v krku jen občas nebo bolest reaguje na kloktadlo a analgetika a nemá potíže s polykáním.

Kdy vždy vyhledat lékaře – praktického nebo LSPP:

- 1/ Trvá-li teplota nad 5 dnů
- 2/ Zhoršuje se kašel, je frekventnější nebo bolestivý, dítě obtížně nebo rychle dýchá
- 3/ Pokud dítě velmi bolí hlava a je světloplaché, pokud nedá bradu na prsa
- 4/ Pokud je schvácené, výrazně unavené a bledé,
- 5/ pokud zvrací a zvracení se nedaří zastavit
- 6// pokud má silný průjem, který se nedaří zastavit
- 7) Když dítě bolí v krku, má teplotu, stav nereaguje na kloktadla a analgetika, má potíže s polykáním
- 8/ pokud má na sobě větší počet náhle vzniklých krevních výronů či modřin
- 9/ při úrazu spojeném s bēzvědomím nebo omezením pohyblivosti
- 10/ jde-li o novorozence a kojence do 1 roku

Kdykoli jindy, mění-li se stav dítěte a máte pochybnosti – tehdy konzultujte nejprve mailem nebo telefonicky.

Pokud máte podezření na infekci koronavirem, v žádném případě nechoďte k lékaři, volejte 112 a postupujte podle instrukcí. Navštívit můžete také speciálně zřízenou ordinaci ve FN.